PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA C.C.P. Montpellier 5238-57

Nº 3 du 21 MAI 1986

BULLETIN DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS ET DU RAZES

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et les Coopératives)

POIS PROTEAGINEUX: Le Mildiou est encore observable dans de très nombreuses cultures, et le risque botrytis subsiste. Pour les parcelles non encore traitées, ou celles dont la protection est ancienne, nous vous recommandons un traitement dès réception du présent bulletin.

Traitez avec PELTAR - 4 Kgs/Ha - volume de bouillie 400 L/Ha.

BLES DURS - BLES TENDRES :

Etat sanitaire très bon pour le moment. Toutefois, les cultures à pleine épiaison stade 10-5, recevront une application destinée à protéger les épis et les deux derniers étages foliaires, <u>les blés durs sont plus concernés</u> que les blés tendres.

Spécialités utilisables pour la protection de l'épi :

- TILT SP 2 1/Ha
- IMPACT T de SOPRA 2.6 1/Ha
- BAYLETON TRIPLE

Ne pas traiter avant le stade indiqué.

BLE DUR PRIMADUR: Les taches et nécroses observables sur certains blés durs, et plus particulièrement PRIMADUR ne sont pas pathologiques, il n'y a donc aucun traitement spécial à leur appliquer, ces désordres sont physiologiques et ont peut-être été accentués par les périodes de froid.

Il faut continuer de soigner ces cultures normalement (fertilisation protection des épis).

MAIS:

- * SESAMIE : Le réseau de piégeage est en place, attendez un nouvel avis avant de traiter.
- * PYRALE : Idem.

TOURNESOL:

Nous observons ces cultures. Vous serez informé de l'évolution éventuelle des ravageurs et maladies de cette plante.

Tirage du 21 MAI 1986 - 1 600 exemplaires)

(c) Bulletin technique des avertissements agricoles - MONTPELLIER 1986 - S.P.V.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

